

## CISTO EPIDÉRMICO

Laís Fernanda Segati de Jesus<sup>1\*</sup>; Ícaro Rufino Gonçalves<sup>1</sup>; Vitória Braga Neves<sup>1</sup>; Úrsula Nunes Rauecker<sup>2</sup>; Cláudia Peixoto Bueno<sup>2</sup>; Clarisse Carolina dos Santos Silva<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Graduanda(o) do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Goiás – São Luís de Montes Belos – Goiás, Brasil; <sup>2</sup> Docente da Universidade Estadual de Goiás – São Luís de Montes Belos – Goiás, Brasil.

\* Autor para Correspondência – e-mail: laisfernandasj@gmail.com

### **Tipo de estudo:** Relato de Caso

O cisto epidérmico é um tumor de natureza benigna caracterizado por um espaço revestido por epitélio e preenchido por pus, queratina ou outros fluidos. O relato de caso teve como objetivo apresentar uma ocorrência de cisto cutâneo ou cisto epidérmico na região crânio medial em um cão de 2 anos de idade, raça boxer. O animal apresentava um tumor com crescimento relativamente lento, elevado, cerca de 1,5 cm de diâmetro, com forma bem definida, firme, compactado e intradérmico. Durante o exame físico, verificou-se que a lesão era esférica, desprendida e de consistência endurecida e que o animal em questão apresentava feições de dor ao toque na área cranial circundante à lesão. Realizou-se a drenagem e observou-se uma secreção sebácea, consistente, pouco sanguinolenta, coloração enegrecida e sem odor. Após a drenagem e o exame clínico foi prescrito o tratamento com spray antibiótico e anti-inflamatório a base oxitetraciclina (6,8 g) com hidrocortisona (2,0 g) aplicado, pelo menos, três vezes ao dia sendo necessária a contenção do animal após a aplicação para secagem completa do produto. Caso não houvesse redução no diâmetro da lesão com o tratamento tópico seria necessário a intervenção cirúrgica já que um aumento poderia trazer ao cão prejuízos em relação às atividades fisiológicas. Após acompanhamento clínico durante cinco meses a intervenção foi descartada visto que com o tratamento houve a regressão do abscesso quase que em sua totalidade, ficando evidente apenas o eriçamento dos pelos da região devido ao processo de cicatrização no local da punção.

**Palavras-chave:** Cisto sebáceo. Tumor. Oxitetraciclina.