

DESCORNA CIRÚRGICA UNILATERAL PÓS-TRAUMÁTICA

Danilo Duarte Oliveira¹; Daniela Duarte Campos ^{2*}; Bruna Paula Alves da Silva³; Jhenyfer Reffatti Peliser²; Isadora Barros Mendes²; Lais Fernanda Segati de Jesus².

¹ Graduando do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera – Anápolis – Goiás, Brasil; ² Graduanda do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Goiás – São Luís de Montes Belos – Goiás, Brasil; ³ Docente da Universidade Estadual de Goiás – São Luís de Montes Belos – Goiás, Brasil.

* Autor para Correspondência – e-mail: danielamedvetueg@gmail.com

Tipo de estudo: Relato de Caso

A descorna consiste na retirada dos cornos dos animais. A descorna cirúrgica tem a finalidade de facilitar o manejo, transporte, evitar acidentes entre os animais e garantir a homogeneidade do rebanho. Este procedimento pode ser realizado em casos de fraturas, bem como em situações estéticas. Objetivou-se com este relato de caso apresentar um procedimento de descorna cirúrgica unilateral pós-traumática. O animal utilizado era uma vaca da raça Gir com peso vivo médio de 470 kg, onde foi verificado um trauma no corno esquerdo ocasionado por briga entre dois animais e ainda a presença de miíase. O procedimento consistiu em assepsia realizada com iodo a 10%, em seguida ocorreu a sedação do animal com o anestésico xilazina, via intravenosa pela veia jugular, na dosagem de 4,7 ml. Após a sedação, foi realizada a tricotomia local, assepsia e anestesia perineural do nervo cornual com cerca de 15 ml do anestésico lidocaína. Logo após, foi executada a incisão profunda na base do corno, aproximadamente 10 cm, e uma segunda incisão próximo a eminência nugal unindo-se à primeira ventralmente, retirando-se o corno esquerdo com o auxílio de uma serra de arco devidamente higienizada. Houve a sutura com fio não absorvível de nylon ponto contínuo simples. A medida terapêutica consistiu na medicação pós-operatória de 47 ml de analgésico (Dipirona®) e 19 ml de antibiótico (Pencivet®) aplicados via intramuscular e ainda a aplicação da pomada Ganadol® de uso tópico diário até a cicatrização completa da sutura. Face ao exposto, a descorna cirúrgica é um método eficaz no tratamento e prevenção de possíveis traumas no animal, contudo deve ser feita por um profissional capacitado e com as medidas sanitárias adequadas.

Palavras-chave: Bovino. Procedimento cirúrgico. Corno.