Detecção de óxido nítrico produzido por microrganismos

Karina F. D. N. Santos¹ (PG)*, Marilene Silva Oliveira¹ (PG), Railane Monteiro de Paula¹ (IC),
Claudia C. G. Martin-Didonet¹ (PQ)

e-mail: kabiomol@gmail.com

¹Câmpus De Ciências Exatas E Tecnológicas – CCET, BR 153 n°3105 - Fazenda Barreiro do Meio, Anápolis - GO, CEP 75132-903.

Resumo: Bactérias promotoras de crescimento de planta são potenciais biofertilizantes devido a várias características como: fixação biológica de nitrogênio, produção de fitormônios e produção de óxido nítrico (NO), entre outras. Este último é um importante mensageiro secundário em plantas com um papel central nas vias de sinalização para o crescimento e desenvolvimento da raiz. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar bactérias produtoras de NO, através do método de Griess associado com a detecção do 2,3-diaminonaftaleno (DAN) por fluorescência, o qual ao entrar em contato com NO forma um complexo fluorescente (NAT). A produção de NO foi monitorada durante 24, 48 e 72 horas, sendo utilizadas oito estirpes: FP2 (*Azospirillum brasilense*), HM053 (*A. brasilense*), SmR1 (*Herbaspirillum seropedicae*), Y2 (*Nitrospirillum amazonense*), BR322 (*Rhizobium tropici*), L40 (*Agrobacterium fabrum*), Pal5 (*Gluconacetobacter diazotrophicus*) e R5 (*Agrobacterium fabrum*). A espécie *R. tropici* (Br322) foi a que apresentou maior produção de NO nos diferentes tempos de crescimento, enquanto a *N. amazonense* (Y2) e *H. seropedicae* (SmR1) não foram capazes de produzir NO. Esses resultados corroboram com as análises de fluorescência do NAT. Esta estratégia de estudo permitirá monitorar bactérias em diferentes ambientes, quanto à produção de NO para elaboração de novas tecnologias para a utilização na agricultura.

Palavras-chave: Rizobactérias. Biofertilizantes. 2,3-diaminonaftaleno (DAN).

Introdução

As rizobactérias que estabelecem interação positiva com a raiz são denominadas de bactérias promotoras de crescimento da planta ou PGPB (*Plant Growth Promoting Bacteria*), e são promissoras como biofertilizantes na agricultura sustentável (VESSEY, 2002). As PGPB podem promover o crescimento das plantas diretamente através da fixação biológica do nitrogênio, disponibilizando nutrientes presentes no solo (solubilizam fósforo e ferro) e pela produção de fitormônios como ácido indol acético (AIA), giberilina e citocinina que induzem mudanças morfológicas e fisiológicas das raízes promovendo o crescimento vegetal. Ainda podem atuar indiretamente reduzindo os efeitos negativos de patógenos (DOBBELAER; VANDERLEYDEN; OKON, 2003; GLICK 2012).

Os benefícios da aplicação de biofertilizantes são amplamente reconhecidos na simbiose de leguminosas com bactérias do gênero *Bradyrhizobium* (VARGAS;

HUNGRIA, 1997). No entanto, outros gêneros de bactérias como *Azospirillum*, *Gluconacetobacter*, *Azoarcus*, *Enterobacter*, *Herbaspirillum*, *Burkholderia* e *Rhizobium* também são potenciais biofertilizantes e por isso têm sido extensivamente estudados (BALANDREAU, 2001; BALDANI et al., 1986; BILAL et al., 1990; GILLIS et al., 1989; REINHOLD-HUREK et al., 1993; YANNI; DAZZO 2010).

Algumas rizobactérias também são responsáveis pelo processo de nitrificação-desnitrificação, sendo o óxido nítrico ou nitric oxide (NO), um intermediário obrigatório nestes processos. No processo de desnitrificação ocorre a redução do nitrato (NO_3^-) a nitrito (NO_2^-), NO, e óxido nitroso (N_2O) a nitrogênio gasoso (N_2), envolvendo as enzimas: nitrato redutase (reduz NO_3^- a NO_2^-), nitrito redutase (NO_2^- a NO), óxido nítrico redutase (NO a N_2O) e a óxido nitroso redutase (N_2O a N_2) (SPANNING et al., 2007). Já no processo de nitrificação ocorre a oxidação da amônia (NH_3) a nitrito (NO_2^-), sendo a hidroxilamina (NH_2OH) um dos intermediários. As principais enzimas desta etapa de nitrificação são: a amônia mono-oxigenase (converte NH_3 para NH_2OH), e a hidroxilamina oxidoreductase (converte NH_2OH em NO_2^-). Existem outras enzimas envolvidas no processo de nitrificação como a nitrito redutase e a óxido nítrico redutase (KLOTZ; STEIN 2008).

Óxido nítrico está envolvido no crescimento, desenvolvimento e na resposta de defesa das plantas (LAMATTINA et al., 2003). Esta molécula sinal induz a produção de AIA, promovendo a formação de raízes adventícias, raízes laterais e pêlos radiculares, o que contribui para o melhoramento do crescimento e desenvolvimento das plantas (PAGNUSSAT et al., 2002). Segundo Koul e colaboradores (2015) existem uma forte correlação entre o metabolismo de NO e a biossíntese de AIA, o que sugere mecanismos de sinalização comuns entre essas duas vias em bactérias.

Desta forma a identificação e seleção de bactérias PGPB produtoras de NO, podem auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias para ser utilizadas na agrônômica. Assim, o objetivo deste trabalho é detectar bactérias produtoras de NO e selecionar estirpes promissoras para testes *in planta* que poderão ser utilizadas como biofertilizantes.

Materiais e Métodos

Material biológico: Foram utilizadas 8 diferentes estirpes de bactérias: 1) FP2 (*Azospirillum brasilense*); 2) HM053 (*A. brasilense*); 3) SmR1 (*Herbaspirillum*

seropedicae); 4) Y2 (*Nitrospirillum amazonense*); 5) BR322 (*Rhizobium tropici*); 6) L40 (*Agrobacterium fabrum*); 7) Pal5 (*Gluconacetobacter diazotrophicus*) e 8) R5 (*Agrobacterium fabrum*).

Meio de cultivo: As bactérias foram crescidas em placas de 96 poços contendo meio líquido NFbHP-lactato (PEDROSA; YATES, 1984), acrescido de 10 mM de KNO_3 , a 30°C sob 140 rpm de agitação. Após 24, 48 e 72 horas de crescimento as bactérias foram coletadas, centrifugadas e o sobrenadante utilizado para as dosagens de NO.

Deteção de NO: A determinação de NO pelo método de Griess foi realizada segundo Amenta e colaboradores (2015). Já para a detecção da fluorescência as bactérias foram crescidas nas mesmas condições descritas acima, exceto que foi acrescido ao meio um captador de NO, o 2,3-diaminonaftaleno (DAN) na concentração de $80 \mu\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$. Foram utilizados 2 controles (meio líquido sem bactéria): 1) meio NFbHP-lactato com DAN; 2) meio NFbHP-lactato sem DAN. Após os tempos de incubação, as bactérias foram centrifugadas e o sobrenadante foi depositado em uma placa de Elisa de 96 poços (própria para fluorescência) e as análises foram realizadas no equipamento ExpectraMax Paradigm (Molecular Devices) com excitação em 360 nm e emissão em 465 nm.

Resultados e Discussão

Através do método de Griess (1879), método colorimétrico que quantifica indiretamente a produção de NO, foi analisada a produção de NO pelas diferentes bactérias após 24, 48 e 72 horas de crescimento em meio líquido. A espécie *R. tropici* (Br322) foi a que apresentou maior produção de NO nos diferentes tempos de crescimento (Tabela 1). Enquanto as espécies *N. amazonense* (Y2) e *H. seropedicae* (SmR1) não foram capazes de produzir NO em nenhum tempo avaliado (Tabela 1). *A. fabrum* (R5) apresentou um valor baixo ($11,7 \mu\text{M}$ de NO) com 24 horas de crescimento, sendo observada ausência de produção de NO nos demais tempos (Tabela 1). As espécies *A. brasilense* (FP2 e HM053), *G. diazotrophicus* (Pal5) e *R. tropici* (Br322) apresentaram produção de NO com 24 horas da inoculação, após esse período houve um decréscimo na produção de NO para todas as estirpes, exceto para a *Azospirillum sp* (L40). Esta estirpe L40 não produziu NO com 24 horas de crescimento, porém com 48 e 72 horas foram detectadas 252,5 e $142,7 \mu\text{M}$ de NO, respectivamente (Tabela 1). Essa diferença no tempo de detecção de NO pode estar relacionada com um perfil de crescimento diferente observado

para a estirpe L40, porém uma curva de crescimento deverá ser realizada para melhor caracterização desta bactéria.

Os resultados qualitativos de fluorescência confirmaram a formação do complexo fluorescente pela reação de NO com DAN. A figura 1 mostra um gráfico em 3D da análise de fluorescência, onde foram observados que as espécies *A. brasilense* FP2, HM053, *R. tropici* Br322 e *G. diazotrophicus* Pal5 foram as que apresentaram maior índice de fluorescência após a incubação com DAN, corroborando com os dados espectroscópicos obtidos pela reação de Griess. Enquanto para as espécies *H. seropedicae* (SmR1), *Azospirillum sp* (L40), *N. amazonense* (Y2) e *A. fabrum* (R5) não foi observada formação do complexo NAT até 72 horas de crescimento, como observado por Griess para *H. seropedicae* (SmR1), *N. amazonense* (Y2) e *A. fabrum* (R5) (produção muito baixa de NO e apenas com 24 horas de crescimento) (Tabela 1 e Figura 1). A *Azospirillum sp* (L40) não formou o complexo fluorescente NAT após 48 e 72 horas como era esperado, já que foi observado a produção de NO pelo método de Griess (Tabela 1 e Figura 1). Esses dados deverão ser melhor investigado.

Creus e colaboradores (2005) também observaram a produção de NO para a espécie *A. brasilense*, e concluíram que o NO produzido por esta bactéria está envolvido com a indução de raízes laterais em plantas de tomate. Já para o gênero *Rhizobium* a produção de NO ocorre durante o processo de simbiose entre *Rhizobium* e leguminosas desde os primeiros passos até a formação dos nódulos de fixação de nitrogênio (PUPPO et al., 2013). O genoma de *H. seropedicae* SmR1 foi completamente sequenciado e não foram encontrados genes que codificam enzimas presentes no processo de desnitrificação, como a óxido nitroso redutase (PEDROSA et al., 2011). Baldani e colaboradores (1986) também não encontram evidências do processo de desnitrificação em *H. seropedicae*. Esses resultados são consistentes com os dados obtidos em nosso trabalho.

Tabela 1. Determinação de óxido nítrico pelo método de Griess (1879) para 8 diferentes estirpes de bactérias crescidas por 24, 48 e 72 horas em meio líquido acrescido de 10 mM de KNO₃ a 30°C sob 140 rpm de agitação.

Espécies e estirpes	[µM de NO] em diferentes tempos:		
	24 horas	48 horas	72 horas
<i>Azospirillum brasilense</i> (FP2)	245,5	104,3	0,0
<i>Nitrospirillum amazonense</i> (Y2)	0,0	0,0	0,0
<i>A. brasilense</i> (HM053)	255,7	167,7	91,5
<i>Gluconacetobacter diazotrophicus</i> (Pal 5)	254,7	183,7	164,5
<i>Rhizobium tropici</i> (Br322)	276,3	252,7	193,7
<i>Azospirillum</i> sp (L40)	0,0	252,5	142,7
<i>Herbaspirillum seropedicae</i> (SmR1)	0,0	0,0	0,0
<i>Agrobacterium fabrum</i> (R5)	11,7	0,0	0,0

Figura 1. Dados de Fluorescência obtidos para os sobrenadantes das 8 diferentes estirpes de bactérias após 24, 48, 72 e 96h de incubação com DAN. Controles sem bactérias: 1) meio líquido NFBHP-lactato sem DAN (linha 5); e 2) meio líquido NFBHP-lactato com DAN (linha 6).

Considerações Finais

O trabalho traz uma nova abordagem para a detecção NO em bactérias ao utilizar o captador 2,3-diaminonaftaleno (DAN), o qual é um método mais sensível que a reação de Griess. Além de identificar bactérias promissoras para testes *in planta* que poderão ser utilizadas como biofertilizantes na agricultura.

Agradecimentos

Aos programas de pós-graduação: Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde (CAPS) e Ciências Moleculares – UEG/Campos Henrique Santillo. Ao suporte financeiro PNPd/CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e CNPq.

Referências

- AMENTA, M; MOLINA-FAVERO, C; CREUS, C. M; LAMATTINA, L. Chapter 9: Nitric oxide in *Azospirillum* and Related Bacteria: Production and Effects. In: Cassán; F.D; Okon, Y; Creus, C.M Handbook for *Azospirillum*. Ed. Springer, pp 155-180, 2015.
- BALANDREAU, J.; VIALARD, V.; COURNOYER, B.; COENYE, T.; LAEVENS, S.; VANDAMME, P. *Burkholderia cepacia* genomovar III is a common plant-associated bacterium. **Appl Environ Microbiol**, v. 67, p.982-985, 2001.
- BALDANI, J. I.; BALDANI, V. L. D.; SELDIN, L.; DÖBEREINER, J. Characterization of *Herbaspirillum seropedicae* gen. nov., sp. nov., a root-associated nitrogen-fixing bacterium. **Int J Syst Bacteriol**, v. 36, p. 86-93, 1986.
- BILAL, R.; RASUL, G.; QURESHI, J.A.; MALIK, K. A. Characterisation of *Azospirillum* and related diazotrophs associated with roots of plants growing in saline soils. **World J Microbiol Biotechnol**, v. 6, p. 46-52, 1990.
- DOBBELAERE, S; VANDERLEYDEN, J; OKON, Y. Plant growth-promoting effects of diazotrophs in the rhizosphere. **Critical Review in Plant Sciences** v. 22, p.107–149, 2003
- GILLIS, M; KERSTERS, K; HOSTE, B; JANSSENS, D; KROPENSTEDT, R. M; STEPHEN, M.P; TEIXEIRA, K. R. S; DÖBEREINER, J; DE LEY, J. *Acetobacter diazotrophicus* sp. nov., a nitrogen-fixing acetic acid bacterium associated with sugarcane. **Int J Syst Bacteriol**, v. 39, p. 361-364, 1989.
- GLICK, B.R. Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications. Hindawi Publishing Corporation, **Scientifica**, 2012.
- GRIESS, J. P. Bemerkungen zu der Abhandlung der HH: Wesely und Benedikt "U" ber einige Azoverbindungen." Ber. Deutsch. **Chem. Ges.** 12, 426–428, 1879.
- KLOTZ, M.G; STEIN, L.Y. Nitrifier genomics and evolution of the nitrogen cycle. **FEMS Microbiology Letters**, v. 278, n. 2, p. 146-56, 2008.
- LAMATTINA, L. et al. The Versatility of an Extensive Signal Molecule. **Annual Review of Plant Biology**, v. 54, n. 1, p. 109–136, 2003.
- PAGNUSSAT, G. et al. Nitric Oxide Is Required for Root Organogenesis. **Plant Physiology**, v. 129, n. 3, p. 954–956, 2002.
- PEDROSA, F.O; YATES, M.G. Regulation of nitrogen fixation (*nif*) genes of *Azospirillum brasilense* by *nifA* and *ntrC* (*glnG*) type genes. **FEMS Microbiol. Lett.** v. 55, p. 95-101, 1984.
- Pedrosa F.O; Monteiro R.A; Wassem R; Cruz L.M; Ayub R.A, et al. Genome of *Herbaspirillum seropedicae* Strain SmR1, a Specialized Diazotrophic Endophyte of Tropical Grasses. **PLoS Genet.** v.7, p.1-10, 2011.
- PUPPO, A; PAULY, N; BOSCARI, A; MANDON, K; Brouquisse, R. Hydrogen Peroxide and Nitric Oxide: Key Regulators of the Legume—*Rhizobium* and Mycorrhizal Symbioses. **Antioxidants & Redox Signaling**, v.18(16)p.2202-2219, 2013.
- REINHOLD-HUREK, B. R; HUREK, T; GILLIS, M; HOSTE, B; VANCANNEYT, M; KERSTERS, K. DE LEY. *Azoarcus* gen. nov. Nitrogen-fixing proteobacteria associated with roots of kallar grass (*Leptochloa fusca* (L.) Kunth) and description of two species, *Azoarcus indigenus* sp. nov. and *Azoarcus communis* sp. nov. **Int J Syst Bacteriol**, v. 43, p. 574-584, 1993.
- SPANNING, R; RICHARDSON, D.J; FERGUSON, S.J. Introduction to the Biochemistry and Molecular Biology of Denitrification. In: Bothe, H.; Ferguson, S; Newton, W.E. **Biology of the Nitrogen Cycle**. Amsterdam: Elsevier, p. 198-217, 2007.
- VARGAS, M. A. T; HUNGRIA, M. Fixação biológica do N₂ na cultura da soja. In: VARGAS, M.A.T.; HUNGRIA, M (Ed.). Biologia dos solos de cerrados. Planaltina, **Biologia dos solos de cerrados**, 1997.
- VESSEY, J.K. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. **Plant and Soil**, v. 255, p.571–586, 2002.
- YANNI, Y.G; DAZZO, F.B. Enhancement of rice production using endophytic strains of *Rhizobium leguminosarum* bv. *trifolii* in extensive field inoculation trials within the Egypt Nile delta. **Plant and Soil**, v. 336, p.129-142, 2010.