Produção da enzima peroxidase por fungos filamentosos isolados de solos de lavouras no estado de Goiás

Thales Antony de Assis Santos^{1*} (PG), Thâmara Machado e Silva, Samantha Salomão Caramori, Solange Xavier dos Santos¹ (PQ).

antonythales@hotmail.com

Universidade Estadual de Goiás - Campus Henrique Santillo; Rodovia BR 153, 3105 - Fazenda Barreiro do Meio, Anápolis - GO, 75132-903.

Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar a produção da enzima peroxidase por fungos filamentosos isolados de solo de diferentes cultivos agrícolas no estado de Goiás: cana-de-açúcar convencional, orgânico e soja, procedentes dos municípios de Anicuns, Goiatuba, Morrinhos e Itumbiara. A partir da técnica de diluições seriadas foram obtidas 10 linhagens fúngicas pertencentes a nove gêneros distintos. Os fungos foram cultivados em farelo de trigo, e a atividade de peroxidase foi detectada através da análise dos extratos enzimáticos brutos, utilizando espectrofotometria, a partir da oxidação do Pírogalo. Todos os isolados fúngicos mostraram atividade de peroxidase, sendo que os níveis da produção da enzima variaram entre 0,52 a 4,23 UE/mL, sendo a linhagem TAS 06, obtida de solo de cultivo de cana-de-açúcar convencional em Itumbiara, a que apresentou maior produção. Os dados revelam perspectivas promissoras para o investimento em pesquisas nas fontes alternativas para obtenção de peroxidase por meio dos fungos estudados. Entretanto, ainda são necessários estudos direcionados à indução e otimização da produção desta enzima, pelas linhagens de fungos utilizadas neste trabalho.

Palavras-chave: Microrganismos de solo; Enzimas oxidativas; Potencial biotecnológico.

Introdução

O uso e a produção de enzimas como biocatalisadores industriais tem sido uma área em intensa expansão, tendo em vista a grande diversidade natural desses compostos, e também devido à disponibilidade de técnicas que extraem facilmente estas enzimas das mais diversas espécies de seres vivos, entre eles os fungos, principalmente aqueles encontrados nos solos, pois o solo atua como um grande “reservatório” dos mais diversos grupos fungos (ORLANDELL et al, 2012).

Muito dessa importância se deve à capacidade desses organismos de sintetizar enzimas despolimerizantes, que são lançadas no substrato (enzimas extracelulares). A indústria foi uma das primeiras a perceber o potencial econômico das enzimas produzidas por fungos de modo que elas têm sido utilizadas em diferentes setores industriais, em aplicações na fabricação de produtos biotecnológicos e na biorremediação (SILVA, 2011).

As enzimas mais utilizadas pela indústria são as chamadas “enzimas ligninolíticas”, compostas pela lacases, lignina peroxidase e manganês peroxidase,

que são enzimas oxi-redutoras, responsáveis pela redução e oxidação de vários substratos. São amplamente usadas na indústria de papel e celulose, pois atuam no branqueamento da matéria-prima utilizada para produzir o papel. E também são usados na biorremediação, devido a seu potencial no tratamento de efluentes da indústria têxtil e de celulose (SOUZA, 2012).

Este trabalho teve por objetivo investigar a atividade da enzima peroxidase por fungos filamentosos, isolados de solo de diferentes cultivos agrícolas no estado de Goiás.

Material e Métodos

Obtenção das amostras de solo

As amostras de solo foram obtidas a partir de coletas em diferentes cultivos agrícolas: cana-de-açúcar convencional, cana-de-açúcar orgânica e soja, em quatro municípios do Sul e Sudeste goiano: Anicuns, Morrinhos, Goiatuba e Itumbiara (Quadro 1).

Obtenção dos isolados fúngicos

As amostras passaram por uma série de diluições sucessivas a partir da adição de 1g de solo em 9 mL de Solução Fisiológica a 0,9% + Tween 80 a 0,02%. Em seguida uma alíquota de 100 µl da suspensão de solo na concentração 10^{-2} foi inoculada sobre a superfície de placas de Petri com meio de cultura BDA+ Cloranfenicol a 0,025 g/100 mL. As culturas foram incubadas em estufa BOD a 25°C.

A identificação taxonômica, ao nível de gênero foi baseada nas características morfológicas, considerando tanto o aspecto macro e microscópico da colônia, segundo a bibliografia pertinente.

Cultivo para produção de enzima

Os fungos foram cultivados a partir da inoculação de três discos de cultura fúngica em BDA de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro em erlenmeyers de 250 mL, contendo 5g de farelo de trigo; 10mL de solução de nutrientes (Sulfato de Amônio a 1% e Sulfato de Magnésio a 0,01%). As culturas foram incubadas em estufa BOD a 25° C, por 7 dias. O extrato enzimático bruto foi obtido a partir da adição de 40 mL de água destilada seguida descompactação do substrato, seguida de filtração.

Análise da atividade da peroxidase

O extrato enzimático bruto foi avaliado quanto à produção da enzima peroxidase, utilizando a espectrofotometria segundo o método de Halpin e Lee

(1987). A mistura de reação foi preparada em tubos de ensaio adicionando 2,4 mL de Pirogalol (preparado em tampão fosfato de sódio 0,1 mol/mL, e pH 6,0); e 0,1 mL da solução enzimática. A reação iniciou-se pela adição de 0,5mL de H₂O₂ a 0,05 mol/ L, e processou-se em 1 minuto, a 420 nm, considerando 0,1 absorvância /min o equivalente a uma unidade de enzima de peroxidase.

Resultados e Discussão

A habilidade de produção de peroxidase pelas linhagens estudadas é apresentada no quadro 1, no qual percebe-se que todos os fungos isolados apresentaram atividade de peroxidase, indicando seu potencial biotecnológico para a produção dessa enzima em larga escala. Cabe destaque para a linhagem TAS 06 (*Mortirella*), obtida de solo de cultivo de cana-de-açúcar convencional em Itumbiara, que apresentou o maior nível de atividade enzimática (4,23 U.E/mL)¹.

Esses resultados são indicativos de que o processo de indução e otimização da produção desta enzima em larga escala, devem passar por análises que levem em consideração, além do substrato, fatores como: umidade, temperatura e pH. Pois como indicado por REGINATO (1992), podem ocorrer oscilações nas atividades das enzimas ligninolíticas durante o crescimento de um fungo, e vários fatores, por exemplo, a variação do pH, pode causar a inativação de algumas enzimas e estimular a secreção de outras.

Considerações Finais

O teste utilizado mostrou que todas as linhagens analisadas apresentaram atividade de peroxidase, revelando perspectivas promissoras para o investimento em pesquisas com estas linhagens como fontes alternativas na produção destas enzimas em larga escala, otimizando-se as condições de cultivos, tais como: substrato, temperatura, pH.

¹ Unidade de enzima/mL considerado após 1min de reação 0,1 de absorvância, sendo a leitura feita no espectrofotômetro.

Quadro 1 – Produção de enzima peroxidase por fungos de solo de cultivos agrícolas em municípios goianos.

Procedência do solo		Gênero/ linhagem fúngica	Quantidade de Peroxidase (UE/mL)
Cultivo agrícola	Município		
Cana-de-açúcar orgânica	Goiatuba	<i>Cladosporium</i> (TAS 03)	1,76
		<i>Phytophthora</i> (TAS 04)	1,28
Cana-de-açúcar convencional	Anicuns	<i>Penicillium</i> (TAS 02)	1,24
	Itumbiara	<i>Penicillium</i> (TAS 13)	0,97
		<i>Aspergillus</i> (TAS 14)	1,03
		<i>Mortirella</i> (TAS 06)	4,23
Soja	Morrinhos	<i>Chrysosporium</i> (TAS 01)	0,52
	Itumbiara	<i>Fusarium</i> (TAS 11)	1,48
	Goiatuba	<i>Cunninghamella</i> (TAS 09)	1,12

Agradecimentos

A Universidade Estadual de Goiás pela concessão da Bolsa de mestrado.

Referências

BAPTISTA, Nunes M. SANTOS, Queiroz A. ARRUDA, Castro F. GUSMÃO, Vanessa. F. *Produção das Enzimas Lignina Peroxidase e Lacase por Fungos Filamentosos*. Revista Scientia plena, vol. 8, n. 1, 2012.

HALPIN, B.E.; LEE, C.Y. Effect of blanching on enzyme activity and quality changes in green peas. *Journal of Food Science*, v. 52, n 4, p. 1002-1005, 1987.

ORLANDELLI, Ravelly Casarotti. SPECIAN, Vânia. FELBER, Aretusa Cristina. PAMPHILE, João Alencar. *Enzimas de interesse industrial: produção por fungos e aplicações*. Revista de Saúde e Biologia, vol.7, n.3, set.-dez. p.97-109, 2012.

REGINATTO, V. Estudo das enzimas produzidas por *Trichoderma longibrachiatum* responsáveis pela degradação de materiais celulósicos. Tese de Mestrado, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, p. 147, Campinas, 1992.

SILVA, Célia Maria de Souza Maganhotto. MELO, Itamar Soares. OLIVEIRA, Pablo Roberto. *Produção de enzimas ligninolíticas por fungos isolados de solos sob cultivo de arroz irrigado*. Jaguariúna : Embrapa Meio Ambiente, 2004.

SILVA, M.G. ; D.G. Almeida ; R.C.M. Miranda ; C.C.S. Maciel¹ ; GUSMÃO, N.B. *Produção da enzima lignina peroxidase por fungos filamentosos utilizando óleo diesel como substrato*. Revista Scientia plena, vol. 7, n. 10, 2011.

SOUZA, Vênia C. SILVA, Ricardo A. CARDOSO, Gleibson D. BARRETO, Artur F. *Estudos sobre fungos micorrízicos*. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande. vol.10, n.10