PRODUTIVIDADE DO CAPIM BRAQUIÁRIA EM FUNÇÃO DE DOSES DE GESSO

Jorge Alves de Almeida¹, André Divino Alves², Yago Magalhães Franco², Lorena Marques Pereira²,
Kássia Luana Sousa Lima², Alessandro José Marques Santos³

¹ Graduando do Curso de Zootecnia, bolsista PBIC/ UEG – Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de São Luís de Montes Belos (GO), ² Graduandos do Curso de Zootecnia – UEG, Unidade Universitária de São Luís de Montes Belos (GO); ³ Docente do Curso de Zootecnia – UEG, Unidade Universitária de São Luís de Montes Belos (GO)

O gesso agrícola, constituído principalmente por sulfato de cálcio ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), um subproduto da indústria do ácido fosfórico, atua sobre dois fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento radicular das plantas: o excesso de alumínio e a deficiência de cálcio. O interesse pelo uso de gesso para diminuir o problema da acidez do subsolo em pastagem já estabelecida é decorrente da sua maior solubilidade em relação ao calcário. Assim, por ser relativamente solúvel, o gesso agrícola aplicado na superfície do solo movimentava-se ao longo do perfil sob a influência da percolação de água. Como consequência, obtêm-se aumento no suprimento de cálcio e redução da toxidez de alumínio no subsolo, além do fornecimento de enxofre para as plantas. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do gesso agrícola na produtividade de pastagem estabelecida de *Brachiaria brizantha* em região de cerrado. O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco doses de gesso (G) (0, 450, 900, 1800 e 3600 kg ha⁻¹ correspondente a 0, 25, 50, 100 e 200% do recomendado) e mais um tratamento controle onde foi utilizado somente a adubação química (AQ). T1 – sem AQ e sem G; T2 – 450 kg ha⁻¹ de G + AQ; T3 – 900 kg ha⁻¹ de G + AQ; T4 – 1800 kg ha⁻¹ de G + AQ; T5 – 3600 kg ha⁻¹ de G + AQ; T6 – AQ. Foi determinado o acúmulo de massa seca do capim em três épocas. Para a massa seca da parte aérea do capim-braquiária houve ajuste quadrático em função das doses de gesso. Os máximos acúmulos foram obtidos com as doses estimadas de 2.186 e 2.025 e 2.685 kg ha⁻¹ de gesso, no primeiro, segundo e terceiro corte, respectivamente. Quando comparado às doses de gesso com a adubação química verifica-se que não houve diferença entre eles no primeiro e segundo corte. Apenas o controle proporcionou menores valores quando comparado às doses de 450, 900 e 1800 kg ha⁻¹ no primeiro corte. No segundo corte os menores valores foram obtidos apenas no controle. Já no terceiro corte verificaram-se maiores acúmulos de massa seca nas duas maiores doses de gesso aplicadas. Quando comparadas com a adubação química, verifica-se que houve incremento de 30 e 23% quando aplicadas as doses de 1.800 e 3.600 kg ha⁻¹ de gesso, respectivamente. Houve aumento da massa seca da braquiária com as doses de gesso.

Palavras-chave: produtividade, forrageira, adubação, análise de solo