



### **Características gerais da espécie *Amazona aestiva*.**

Pedro Henrique Abreu Silva<sup>1\*</sup>, Alliny das Graças Amaral<sup>2\*</sup>, Gabriella Braga Carvalho<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Discente do Curso de Zootecnia da UEG - Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, Goiás, Brasil; <sup>2</sup>Docente da Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, Goiás, Brasil;

\*pedroh1920@hotmail.com

Os papagaios são pertencentes à família dos psitacídeos, uma das famílias de aves mais populares do mundo. São ícone de beleza, vitalidade e tropicalidade. O notável papagaio verdadeiro pode ser classificado como a ave com potencial de aprendizado, podendo vocalizar sílabas e palavras mais complexas, isto ocorre por apresentar a língua carnosa e uma estrutura chamada siringe modificada, por isso é uma das aves mais procuradas como animal de estimação. Esta espécie vocaliza com relativa frequência, durante meia hora aproximadamente ao amanhecer e quando ouvem sons de outras aves. Apresenta fácil adaptabilidade à área residencial, especialmente por quem deseja tê-lo como ave de estimação. O objetivo da revisão e apresentar as características do papagaio verdadeiro. O *Amazona aestiva* (Papagaio verdadeiro) tem como diferencial a coloração da cabeça, que é azul no topo e bochechas, amarela no topo e ao redor dos olhos. O bico e as narinas são escuros. A plumagem do corpo é verde, com penas vermelhas na asa e extremidades em azul escuro e pode ser confundido com o papagaio-do-mangue por terem semelhanças.. Sua altura é de 35 a 37 cm e pode viver até os 60 anos de idade, o peso é em torno de 400 g aproximadamente. Já, os animais domesticados podem viver aproximadamente apenas 15 anos, devido a alimentação e aos tratamentos concedidos. Esta espécie habita no interior da América do Sul, Paraguai, Bolívia, norte da Argentina e o Brasil. Na natureza alimentam-se de castanhas, frutas silvestres e sementes, principalmente de leguminosas, em criatórios se alimentam de ração, frutas e verduras. Deve-se ter alguns cuidados básicos com as aves que devem ser diários, como a troca da água e a limpeza do viveiro. O período de acasalamento do papagaio verdadeiro é entre os meses setembro e o final de fevereiro, sua maturidade sexual é entre o terceiro e o quarto ano de idade. O macho é quem faz a escolha da fêmea, formando a união e o acasalamento. Esta espécie é monogâmica, tanto que se o parceiro for capturado ou vier a morrer o parceiro permanece sozinho até o final de sua vida. As ninhadas são efetuadas nos topos das árvores, onde se sentem mais seguros e protegidos para seu período de reprodução. A fêmea bota de 3 a 5 ovos e o seu período de incubação varia entre 24 a 29 dias, neste período o macho tem a função de proteger o ninho de predadores. Os filhotes de Papagaio Verdadeiro deixam o ninho cerca de 60 dias após a eclosão dos ovos. A alimentação do

filhote é feita pela mãe nos primeiros oito dias, logo após estes primeiros dias, a alimentação é dada pelo pai e pela mãe. Após esse período reprodutivo as aves voam em bandos deixando sua marca por onde passa, deslumbrando sua beleza e vocalização característica.

**Palavras-chave:** Amazona aestiva, adaptável, reprodução.