

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA EM CÃO

Rilquia Horrana Miranda¹; Thaynara dos Santos Nunes¹; Gabriel Silveira Cunha²; Denise Caroline Toledo³.

¹ Graduanda do Curso de Medicina Veterinária do Instituto Unificado de Ensino Superior Faculdades Objetivo (IUESO) – Goiânia – Goiás, Brasil; ² Graduando do Curso de Química Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) – Alfenas – Minas Gerais, Brasil; ³ Docente do Curso de Medicina Veterinária do Instituto Unificado de Ensino Superior Faculdades Objetivo (IUESO) – Goiânia – Goiás, Brasil.

* Autor para Correspondência – e-mail: thaynarnsn28@gmail.com

Tipo de estudo: Relato de caso

Hérnias diafragmáticas ocorrem quando o diafragma sofre lesão que ocasiona ruptura deste órgão, possibilitando a passagem de órgãos abdominais para a cavidade torácica. Hérnias diafragmáticas podem ser congênicas ou traumáticas e a correção dessa condição patológica é feita por procedimento cirúrgico. Durante aula de Patologia do Instituto Unificado de Ensino Superior - Faculdades Objetivo, Goiânia, foi realizada necropsia em cão fêmea, dois anos, raça Pinscher com objetivo de confirmar a suspeita da proprietária de que o cão, que foi encontrado morto, havia sido atropelado. Durante o procedimento, no exame externo não foi observada alteração digna de nota e ao realizar a abertura das cavidades torácica e pélvica foi possível verificar que o diafragma apresentava área de ruptura do lado direito, por onde parte do fígado passava adentrando à cavidade torácica. Além disso, foi observado hemotórax e hemorragias pulmonares difusas. De acordo com os achados de necropsia foi possível confirmar a causa mortes como insuficiência respiratória ocasionada por hérnia diafragmática de origem traumática.

Palavras-chave: Diafragma. Fígado. Hemorragias. Hemotórax.